AUGENREGION

Für ein natürliches waches Erscheinungsbild Ihrer Augenregion bedarf es einer umfassenden Untersuchung aller anatomischen Strukturen. Der Stand der Augenbrauen, Veränderung des Fettgewebes um das Auge, eine vorgewölbte Tränendrüse oder eine mögliche Erschlaffung der Unterlidregion bestimmen neben vielen anderen Veränderungen die für Sie passende Operationsmethode. Bei Bedarf kann eine Oberlidstraffung (Oberlid Blepharoplastik) zusammen mit einer Unterlidstraffung (Unterlid Blepharoplastik) und unterstützenden Maßnahmen der Haut (PRP-Injektion, Lipofilling) vorgenommen werden.

Oberlidstraffung (Oberlid Blepharoplastik)

Ein wacher und frischer Blick soll Ziel der Oberlidstraffung sein. Durch Abnahme der Elastizität von Haut und Muskeln sowie einer Veränderung des Fettgewebes um das Auge herum kommt es häufig zu einem ausgeprägten Überhang an Oberlidhaut. Falten und Fettgewebe lassen die Augen müde und schwer erscheinen. Zusätzlich können Einschränkungen des Blickfeldes die Aktivitäten des täglichen Lebens stark einschränken. Um eine natürliche Augenform und ein verjüngendes Erscheinungsbild zu ermöglichen, bedarf es einer subtilen Präparation mit angemessener Resektion der überschüssigen Haut sowie Teilentfernung des Fettgewebes.

Eingriff

Die Oberlidstraffung (Blepharoplastik der Oberlider) wird ambulant in Dämmerschlaf oder einer leichten Narkose vorgenommen. Bei einer Kombination mit einer Unterlidstraffung (Blepharoplastik der Unterlider) empfehlen wir zur optimalen postoperativen Betreuung die stationäre Aufnahme für eine Nacht. Entsprechend der präoperativ vorgenommenen Einzeichnung erfolgt die Exzision der Haut und die behutsame Entfernung sich vorwölbenden Fettgewebes. Der Wundverschluss erfolgt unter Lupenbrillenvergrößerung mit feinstem Nahtmaterial, so dass die spätere Narbe sich nur als feine Linie in der Umschlagsfalte der Oberlidhaut versteckt.

Nebenwirkungen

Aufgrund der Verwendung feinster Instrumente aus der Mikrochirurgie sind Präparation und Blutstillung sehr effektiv und präzise. Schwellungen und Blutergüsse sind meist nur sehr gering und bilden sich nach 10-14 Tagen komplett zurück. Eine Wiederaufnahme von Arbeit und Alltagsaktivitäten kann meist noch in derselben Woche erfolgen. Die standardisierte Gabe von Augentropfen für die Dauer von einer Woche soll etwaigen Reizerscheinungen des Auges entgegenwirken und das Auge beruhigen.

Nachsorge

Bereits am 3. postoperativen Tag werden die ersten Fäden und die aufliegenden sterilen Pflaster entfernt. Für ein optimales Heilen wird die filigrane Naht fortan offengelassen und mit Spezialsalbe eingecremt. Dies ermöglicht einen reizarmen Heilungsprozess sowie ein problemloses Entfernen des Restfadens nach 1 Woche. Regelmäßiges Kühlen sowie die Applikation von Augentropfen lassen etwaige Schwellungen rasch abklingen.

Kosten

Die Kosten für eine rein ästhetische Blepharoplastik werden in der Regel nicht von den Krankenversicherungen übernommen. In manchen Fällen wird bei medizinischer Indikation und dem Nachweis einer ausgeprägten

© 2020 Dr. Jan Wynands

Gesichtsfeldeinschränkung die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung bewilligt. Wie bei allen ästhetischen Eingriffen orientieren sich die Kosten einer Blepharoplastik am zeitlichen Aufwand, zusätzlichen Eingriffen (Blepharoplastik der Unterlider), OP-Benutzung und Narkoseverfahren (Dämmerschlaf oder Narkose). Dr. Wynands ist ausschließlich privatärztlich tätig, eine Kostenerstattung durch eine gesetzliche Krankenversicherung ist nicht möglich. Die Kosten werden vorher ausführlich und transparent dargestellt und sind als Fallpauschale zu verstehen. Wir empfangen Sie sehr gerne zu einem Beratungsgespräch, um Sie über die Kosten und einen möglichen Weg zu einem natürlich strahlenden Blick zu informieren.

© 2020 Dr. Jan Wynands